

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Broncophen Aerol, suuõõnesprei, lahus aed-liivatee ürdi vedelekstrakt, salvei lehtede vedelekstrakt

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Broncophen Aerol ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Broncophen Aerol'i kasutamist
3. Kuidas Broncophen Aerol'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Broncophen Aerol'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Broncophen Aerol ja milleks seda kasutatakse

See on traditsiooniline taimne ravimpreparaat, mida kasutatakse leevendava vahendina ülemiste hingamisteede infektsioonidega kaasneva suuõõne- või neelupõletiku korral.

See ravim on traditsiooniline taimne ravimpreparaat, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Broncophen Aerol'i kasutamist

Broncophen Aerol'i ei tohi kasutada

- kui olete aed-liivatee, salvei või teiste huulõieliste sugukonda kuuluvate taimede või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Broncophen Aerol'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil tekib õhupuudus, palavik või mädane rögaeritus, peate pöörduma arsti poole.

Ärge pihustage seda ravimit silma ega ninna.

Ärge pihustage seda ravimit lahtisesse leeki.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, sest puuduvad piisavad andmed kasutamise kohta selles vanuserühmas.

Muud ravimid ja Broncophen Aerol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Broncophen Aerol'i koostoimeid teiste ravimitega ei ole uuritud.

Salvei lehti sisaldavate preparaatide võtmine võib mõjutada GABA retseptori vahendusel toimivate ravimite (nt barbituraadid ja bensodiasepiinid) toimet, ehkki seni ei ole selle kliinilisest avaldumisest teatatud. Seetõttu ei ole Broncophen Aerol'i soovitatav kasutada samaaegselt nende ravimitega.

Broncophen Aerol koos toidu ja joogiga

Puuduvad uuringuandmed toidu ja joogi mõju kohta ravimi toimele.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Broncophen Aerol'i ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal, sest puuduvad piisavad andmed ohutuse kohta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Broncophen Aerol ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

Broncophen Aerol sisaldab alkoholi

Ravim sisaldab 75,7 mg alkoholi (etanol) ühes pihustuses. Alkoholi sisaldus selle ravimi ühes pihustuses on väiksem kui 2 ml-s õlles või 1 ml-s veinis.

Väike kogus alkoholi selles ravimis ei oma märkimisväärset toimet.

Alkoholi sisalduse tõttu võib see ravim põhjustada kahjustatud nahal põletustunnet.

Broncophen Aerol sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes pihustuses, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Broncophen Aerol'i kasutada


Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teile määranud teisiti, pihustage suhu ja neelu 1...2 vajutust 2...4 korda ööpäevas.

Manustamisviis

Sprei manustamiseks suuõõnde.

- Tõstke pihustipumba pööratav otsik pudeli suhtes täisnurga alla (vt joonist).
- Suunake pihustipea soovitud manustamiskohta suus. Pihustipumba otsik võimaldab lihtsasti ulatuda ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.
- Pihustage Broncophen Aerol'i suuõõnespreid valulikele kohtadele, vajutades pihustipumbale 1...2 korda. Enne esimest kasutamist pumbake paar korda ühtlase pihustusjoa saamiseks.
- Pärast iga manustamist keerake otsik tagasi, nii sulgete pihustipumba (vt joonist).



Ravi kestus

Kui sümptomid süvenevad või püsivad pärast 7-päevast kasutamist, peate pidama nõu arstiga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, sest puuduvad piisavad andmed kasutamise kohta selles vanuserühmas.

Kui te kasutate Broncophen Aerol'i rohkem, kui ette nähtud

Aed-liivatee üleannustamisest ei ole teatatud. Seda ravimit kasutades ei ole salvei üleannustamine tõenäoline.

Kui te unustate Broncophen Aerol'i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata, ning jätkake (vajadusel) ettenähtud viisil.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Täheldatud on allergilisi reaktsioone, samuti mao häireid. Nende esinemissagedus ei ole teada.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Broncophen Aerol'i säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 8 nädalat.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja pakendil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Broncophen Aerol sisaldab

- Toimeained on aed-liivatee ürdi vedelekstrakt ja salvei lehtede vedelekstrakt.
1 ml lahust sisaldab:
290 mg aed-liivatee ürdi vedelekstrakti (1 : 4-6), ekstrahent: etanool 70% V/V
290 mg salvei lehtede vedelekstrakti (1 : 4-6), ekstrahent: etanool 70% V/V
- Teised koostisosad on piparmündi lehtede (*Menthae piperitae folium*) vedelekstrakt (droogi/ekstrakti suhe 1 : 4-6, ekstrahent etanool (70% V/V)), levomentool, naatriumsahhariin (E954), hüdroksüpropüütselluloos.

1 pihustus = 126 mg = 0,14 ml.
Etanoolisisaldus ligikaudu 68% V/V.

Kuidas Broncophen Aerol välja näeb ja pakendi sisu

Broncophen Aerol suuõõnesprei on selge pruuni värvi lahus (suuõõnde manustamiseks mõeldud spreid), millel on iseloomulik (eeskätt piparmündi) lõhn ja maitse.

Suuõõnesprei on saadaval merevaiguvärvi klaaspudelites, mis on varustatud annustamispumba ja pikendatud pihustiotsikuga; pudel sisaldab 15 ml lahust (ligikaudu 100 pihustust).

Müügiloa hoidja ja tootja

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Vienna
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2024.