

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Broncophen Aerol, suuõõnesprei, lahus**

Aed-liivatee ürdi vedelekstrakt, salvei lehtede vedelekstrakt

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Broncophen Aerol ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Broncophen Aerol'i kasutamist
3. Kuidas Broncophen Aerol'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Broncophen Aerol'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Broncophen Aerol ja milleks seda kasutatakse**

Broncophen Aerol suuõõnesprei on lahus, mis sisaldab toimeainetena aed-liivatee ürdi ja salvei lehtede vedelekstrakte.

See on traditsiooniline taimne ravimpreparaat, mida kasutatakse leevendava vahendina ülemiste hingamisteede infektsioonidega kaasneva suuõõne- või neelupõletiku korral.

See ravim on traditsiooniline taimne ravimpreparaat, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **2. Mida on vaja teada enne Broncophen Aerol'i kasutamist**

##### **Mida on vaja teada enne Broncophen Aerol'i kasutamist**

Kui olete aed-liivatee, salvei või teiste huulõieliste sugukonda kuuluvate taimede või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Broncophen Aerol'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Mitte pihustada silma ega ninna.
- Mitte pihustada lahtise tule läheduses.
- Kui tekib hingeldus, palavik või mädane rögaeritus, peate pöörduma arsti poole.

##### **Lapsed ja noorukid**

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, sest puuduvad piisavad andmed kasutamise kohta selles vanuserühmas.

### **Muud ravimid ja Broncophen Aerol**

Õelge oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Broncophen Aerol'i koostoimeid teiste ravimitega ei ole uuritud.

Salvei lehti sisaldavate preparaatide võtmine võib mõjutada GABA retseptori vahendusel toimivate ravimite (nt barbituraadid ja bensodiasepiinid) toimet, ehkki siiani ei ole selle kliinilisest avaldumisest teateid. Seetõttu ei ole Broncophen Aerol'i soovitatav kasutada samaaegselt koos nende ravimpreparaatidega.

### **Broncophen Aerol koos toidu ja joogiga**

Puuduvad uuringuandmed toidu ja joogi mõju kohta ravimi toimele.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Broncophen Aerol'i ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal, sest selle kohta puuduvad piisavad andmed.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Broncophen Aerol ei oma või omab ebaolulist toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

### **Broncophen Aerol sisaldab alkoholi**

See ravimpreparaat sisaldab väheses koguses alkoholi (etanooli), vähem kui 100 mg annuse kohta (60% V/V).

Kui teil on sõltuvus alkoholist, ärge kasutage Broncophen Aerol'i.


## **3. Kuidas Broncophen Aerol'i kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teile määranud teisiti, kasutage spreid 2...4 korda ööpäevas, pihustades lahust suhu ja neelu, igal manustamisel vajutades pihustit üks või kaks korda.

Manustamine:

- Tõstke pihustipumba pööratav otsik pudeli suhtes täisnurga alla (vt joonist).
- Suunake pihustipea soovitud manustamiskohta suus. Pihustipumba otsik on kergesti suunatav.
- Pihustage Broncophen Aerol'i, vajutades korduvalt pihustile.
- Pärast iga manustamist keerake otsik tagasi, nii sulgete pihustipumba (vt joonist).



### **Kasutamine lastel ja noorukitel**

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada lastel ja noorukitel, sest selle kohta puuduvad piisavad andmed.

### **Kui te kasutate Broncophen Aerol'i rohkem kui ette nähtud**

On teatatud üleannustamise juhtudest, mille korral manustati annuseid, mis vastasid rohkem kui 15 g salveilehtedele. Sellisel juhul võivad teil tekkida

- kuumatunne
- südame löögisageduse kiirenemine
- pearinglus
- krambid.

Olulise üleannustamise korral võtke ühendust arstiga. Ta soovib teile asjakohaseid ravivõtteid.

### **Kui te unustate Broncophen Aerol'i kasutada**

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

### **Kui te lõpetate Broncophen Aerol'i kasutamise**

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aed-liivateed sisaldavate ravimpreparaatide kasutamisel on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone (sh üks anafülaktilise šoki juht ja üks Quincke ödeemi juht) ning maoärritust.

Alkoholisalduse tõttu võib põletikulistes piirkondades esineda mööduvat põletustunnet.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on teadmata.

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Broncophen Aerol'i säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 8 nädalat.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja pakendil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## 6. Pakendi sisu ja muu teave

### Mida Broncophen Aerol sisaldab

- Toimeained on: aed-liivatee ürdi vedelekstrakt ja salvei lehtede vedelekstrakt.
- Teised abiained on:  
Piparmündi lehtede vedelekstrakt (1:4 – 6), ekstrahent etanool 70% V/V,  
mentool, naatriumsahhariin (E 954), hüdroksüpropüütselluloos, etanool (alkohol) (60%),  
puhastatud vesi.

1 ml lahust sisaldab:

290 mg aed-liivatee ürdi vedelekstrakti (1:4 - 6), ekstrahent: etanool 70% V/V.

290 mg salvei lehtede vedelekstrakti (1:4 - 6), ekstrahent: etanool 70% V/V.

1 pihustus = 0,14 ml.

### Kuidas Broncophen Aerol välja näeb ja pakendi sisu

Broncophen Aerol suuõõnesprei on selge pruun lahus, millel on iseloomulik lõhn ja maitse.

Suuõõnesprei on saadaval merevaikkollastes klaaspudelites, mis on varustatud pihustipumba ja pikendatud pihustiotsikuga.

Pakendis on pudel 15 ml lahusega (piisab vähemalt 100 manustamiskorraks).

### Müügiloa hoidja ja tootja

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21,

1160 Vienna

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

**Infoleht on kinnitatud mais 2015**